







**Composition :**

Chaque flacon contient :  
Chlorhydrate de vancomycine USP  
équivalent à la vancomycine 500 mg  
Chaque ampoule de 10 ml contient :  
Eau pour préparations injectables USP q.s.

**Posologie :** Selon les directives du médecin.

À conserver à une température ne dépassant pas 30 °C. À protéger de la lumière.

**Conseil d'utilisation :**

Reconstituer en ajoutant de l'eau stérile pour injection USP et utiliser immédiatement après la préparation.

Tenir hors de portée des enfants.

**Attention :** Si une particule étonnante apparaît le  
dans l'ampoule après dissolution du contenu,  
n'utilisez pas la solution et demandez-en un nouveau.



500mg

Prolect life sciences  
Quality assurance cure pledge



Chlorhydrate de  
Vancomycine pour  
Injection USP

**VANCORICH-500**

LYOPHILISÉ

POUR UTILISATION EN  
PERFUSION INTRAVEINEUSE

Une ampoule contenant de l'eau stérile pour injection USP est incluse dans ce pack.

Eau stérile pour préparations injectables USP pour N° d'autorisation de fabrication, numéro de lot, date de fabrication et date d'expiration tels qu'imprimés sur l'ampoule

Code neutre

HP/DRUGS/N-MB/2019/208

Numéro de lot :

Date de fabrication :

Date d'expiration :

Marketed by :



Prolect life sciences  
Quality assurance cure pledge

HN-0473/01, Sr. No. - 32/2, Wing-I,  
Ground Floor, Shop No. 10,  
Vidyaniketan, Undri, Pune - 411060.  
TM: Trademark under registration

L 30 H 70 W 30 MM



